

PALFORZIA®

Guide pour la réduction des risques liés aux médicaments et à leur utilisation destiné aux patients et aux personnes en charge

Veillez également tenir compte de la notice d'utilisation concernant PALFORZIA® (Allergènes d'arachide [*Arachis hypogaea*])

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permet l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de santé sont tenus de déclarer toute suspicion d'effet secondaire nouveau ou grave. Consulter la dernière page pour connaître les modalités de déclaration des effets secondaires.



Champs d'application:

PALFORZIA® peut être utilisé chez les patients âgés de 4 à 17 ans présentant un diagnostic confirmé* d'allergie à l'arachide cliniquement significative, afin d'élever la dose seuil d'arachide tolérée sans survenue de réactions allergiques.

Si nécessaire, le traitement par PALFORZIA® peut être poursuivi chez les patients âgés de 18 ans et plus.

PALFORZIA® ne peut être utilisé qu'en tant que mesure complémentaire à un régime d'éviction de l'arachide.

Vous trouverez des informations complémentaires dans la notice d'utilisation de PALFORZIA® sur www.swissmedicinfo.ch

* Pour que le diagnostic soit confirmé, les conditions suivantes doivent être remplies de manière cumulative:

- Antécédents de réactions allergiques aux arachides
- Mise en évidence d'une sensibilisation spécifique (IgE et/ou prick test)
- Réponse à un test de provocation orale à une dose seuil \leq 300 mg de protéines d'arachide ou mise en évidence d'une sensibilisation forte et concluante.

À propos de ce guide

PALFORZIA® a été prescrit à votre enfant. Ce guide a donc été conçu pour vous donner des consignes de sécurité importantes pour le traitement par PALFORZIA®. Ce guide doit être lu parallèlement à la notice jointe à la boîte de PALFORZIA® de votre enfant.

Guides et vidéos pour les enfants

Il existe toute une série de guides sur PALFORZIA®, adaptés à l'âge de votre enfant. Il pourra les lire avec ou sans votre aide. Il existe aussi toute une série de vidéos auxquelles vous pouvez accéder en scannant le code QR ci-dessous ou en consultant le site Internet:

www.aimmune.ch/patienten



Astuce:

Tenez la caméra de votre smartphone au-dessus du code QR pour ouvrir le lien.

Table des matières

1	Résumé des consignes de sécurité	5
2	Quelques éléments essentiels auxquels vous devez penser	9
3	À propos de PALFORZIA®	16
4	Autres consignes pratiques	26

1

Résumé des consignes de sécurité

Résumé des consignes de sécurité

Vous devez impérativement avoir lu et compris les informations suivantes et les avoir expliquées à votre enfant. N'hésitez pas à poser vos questions éventuelles à votre médecin. PALFORZIA® est un médicament indiqué en cas d'allergie à l'arachide. Comme tout médicament, il peut avoir des effets secondaires. Ce guide contient des informations importantes sur la prise en toute sécurité du médicament. Avant d'aborder ce sujet, il convient toutefois d'évoquer deux effets secondaires qui peuvent survenir avec PALFORZIA®, à savoir **une réaction allergique grave et une inflammation de l'œsophage**.

Pour minimiser le risque de réaction, vous et votre enfant devez savoir:

- à quels symptômes vous devez faire attention;
- quand vous devez contacter votre médecin ou les urgences;
- quelles sont les choses importantes à faire ou à ne pas faire pendant le traitement.

Réactions allergiques graves (anaphylaxie)

Les réactions allergiques graves (anaphylaxie) peuvent toucher différentes parties du corps en même temps et peuvent engager le pronostic vital. Les réactions peuvent survenir immédiatement ou quelques heures après avoir été en contact avec un allergène. Une anaphylaxie peut combiner les symptômes suivants:

- Troubles de la respiration
- Sensation de gorge serrée ou de corps étranger dans la gorge
- Difficultés à avaler ou à parler
- Enrouement
- Fortes crampes ou douleurs d'estomac, vomissements ou diarrhée

Si une combinaison de ces symptômes survient chez votre enfant et si vous soupçonnez une anaphylaxie, suivez le plan d'urgence élaboré pour votre enfant, utilisez le stylo d'adrénaline de votre enfant selon les instructions figurant sur le stylo et appelez les urgences.

Si vous ou votre enfant avez des questions ou des doutes sur l'utilisation du stylo d'adrénaline, parlez-en à votre médecin. Il ou elle pourra vous expliquer quand et comment vous devez utiliser le stylo.

Inflammation de l'œsophage

Une **inflammation de l'œsophage** a déjà été documentée chez certaines personnes allergiques à l'arachide et traitées par immunothérapie orale.

Les symptômes d'une inflammation de l'œsophage peuvent être, entre autres:

- Des difficultés à avaler, des aliments qui restent coincés dans la gorge, une sensation de brûlure dans la poitrine, dans la bouche ou dans la gorge, des nausées, des vomissements ou des régurgitations.

Si l'un de ces symptômes apparaît chez votre enfant, contactez votre médecin qui suivra de près votre enfant pour surveiller les problèmes d'estomac. En cas de soupçon d'une inflammation de l'œsophage, le traitement par PALFORZIA® sera interrompu.

Autres effets secondaires possibles:

Sensation de gorge serrée, vomissements, crampes ou douleurs d'estomac, sensation d'inconfort, réactions allergiques (légères, modérées ou graves), toux, éternuements, irritation de la gorge, picotements dans la bouche ou démangeaisons dans et autour de la bouche, éruption cutanée, peau qui démange, troubles de la respiration, respiration sifflante.

À faire et à ne pas faire

Afin de minimiser le risque d'effets secondaires, veillez à ce que votre enfant respecte les règles suivantes lors de son traitement par PALFORZIA®.

✓ À faire



Prendre PALFORZIA® tous les jours



Prendre PALFORZIA® au cours des repas



Prendre PALFORZIA® à peu près à la même heure chaque jour (de préférence au dîner)



Toujours avoir le stylo d'adrénaline sur soi

À ne pas faire



NE PAS consommer d'arachides



NE PAS boire d'alcool 2 heures avant ou après la prise d'une dose



NE PAS prendre PALFORZIA® si votre enfant ne se sent pas bien



NE PAS faire de sport, prendre une douche chaude ou un bain chaud juste avant ou dans les 2 à 3 heures suivant la prise de PALFORZIA®



NE PAS prendre PALFORZIA® dans les 2 heures précédant le coucher



NE PAS avaler la gélule et ne pas inhaler la poudre

2

Quelques éléments essentiels auxquels vous devez penser



X

De même, après avoir pris la dose de PALFORZIA®, votre enfant **ne doit pas consommer d'arachides ni d'aliments qui en contiennent.**



Votre enfant doit **toujours** avoir le stylo d'adrénaline sur lui.




Image symbolique



Votre enfant doit prendre le médicament **tous les jours au cours d'un repas, à peu près à la même heure de la journée.**

De préférence lors du dîner, et au moins 2 heures avant d'aller se coucher.

X

Votre enfant **ne doit pas avaler les gélules.** Le contenu des gélules et des sachets doit être mélangé à des aliments qui ne sont ni trop chauds ni trop liquides.

✓ Les yaourts, les compotes de pommes ou les puddings sont, par exemple, particulièrement adaptés.

✗ Vous ne devez pas mélanger PALFORZIA® dans des préparations telles que les soupes et les smoothies.



Quelques éléments essentiels auxquels vous devez penser



Veillez à ce que votre enfant **reste calme et ne fasse pas de sport** avant ou dans les 2 à 3 heures suivant la prise de PALFORZIA®.



Votre enfant **ne doit également pas** prendre PALFORZIA® s'il ne se sent pas bien.



Votre enfant **ne doit pas prendre de douche chaude ou de bain chaud** avant ou dans les 2 à 3 heures suivant la prise de PALFORZIA®.



Votre enfant **ne doit pas** prendre PALFORZIA® dans les 2 heures précédant le coucher.





Quelques éléments essentiels auxquels vous devez penser



La réaction de l'organisme à PALFORZIA® peut être modifiée par la consommation d'alcool.

Parlez-en impérativement avec votre enfant. S'il consomme de l'alcool, cela ne doit pas avoir lieu dans les 2 heures avant ou suivant la prise du médicament.



La réaction de l'organisme à PALFORZIA® peut changer en période de menstruation (règles).

Si votre fille présente des symptômes pendant ses règles, parlez-en impérativement à son médecin pour qu'il ou elle modifie éventuellement la dose de PALFORZIA®.



La réaction de l'organisme à PALFORZIA® peut être modifiée par la prise de certains antidouleurs (p. ex. ibuprofène et aspirine).

Soyez donc extrêmement vigilant(e) lorsque vous donnez ces médicaments à votre enfant.



Vous devez contacter le médecin de votre enfant dans les cas suivants:

- **Votre enfant souffre d'une maladie intercurrente (qui survient au cours d'une autre maladie, p. ex. rhume ou infection grippale)**
- **L'asthme de votre enfant s'aggrave**
- **Votre enfant est soumis à un stress important**
- **Votre enfant est anormalement fatigué ou n'a pas bien dormi depuis plusieurs jours**

3

À propos de PALFORZIA®

À propos de PALFORZIA®

Vous trouverez ci-dessous certaines réponses aux questions que vous pouvez vous poser concernant le traitement de votre enfant par PALFORZIA®:

? Qu'est-ce que PALFORZIA® et qui peut le prendre?

PALFORZIA® est un médicament indiqué dans le cadre d'une immunothérapie orale contre l'allergie à l'arachide. C'est un médicament destiné aux enfants et adolescents âgés de 4 à 17 ans chez lesquels une allergie à l'arachide a été constatée. Si votre enfant a commencé à prendre PALFORZIA® avant ses 18 ans, il peut poursuivre le traitement après ses 18 ans. PALFORZIA® se présente sous forme de poudre contenant une petite quantité très précise de protéines d'arachide. Le médicament est administré en petites doses qui sont mélangées à des aliments et prises ainsi lors des repas. La dose est augmentée progressivement sur plusieurs semaines.

? Qui ne peut pas prendre PALFORZIA®?

PALFORZIA® ne doit pas être pris en présence des problèmes suivants:

- Asthme sévère ou non contrôlé.
- Antécédents d'inflammation de l'œsophage, autre maladie gastro-intestinale à éosinophiles, reflux gastro-œsophagien chronique, récurrent ou sévère (MRGO), symptômes de dysphagie ou symptômes gastro-intestinaux récurrents d'étiologie inexpliquée.
- Antécédents de mastocytose grave.
- Hypersensibilité à l'un des excipients (autres composants) selon la composition (cellulose microcristalline, amidon de maïs partiellement pré-gélatinisé, dioxyde de silicium hautement dispersé, stéarate de magnésium).

- Hypertension artérielle non contrôlée ou maladies cardiovasculaires.
- Les patients ayant connu une anaphylaxie grave ou potentiellement mortelle au cours des 60 derniers jours ne doivent pas recevoir un traitement par PALFORZIA®.

Si vous êtes incertain(e) ou si vous n'avez jamais entendu parler de l'une de ces maladies, parlez-en à votre médecin, qui pourra vous donner plus d'explications détaillées.

? Combien de temps mon enfant doit-il prendre PALFORZIA®?

Il est nécessaire de prendre PALFORZIA® quotidiennement afin de conserver son efficacité et d'en assurer la tolérance.

Les données d'efficacité sont disponibles actuellement pour une durée de traitement par PALFORZIA® allant jusqu'à 24 mois.

? Mon enfant est-il toujours allergique à l'arachide pendant le traitement par PALFORZIA®?

Oui, il est toujours allergique à l'arachide, même s'il n'a peut-être plus de réaction allergique lorsqu'il mange accidentellement une cacahouète. PALFORZIA® vise à rendre le système immunitaire de votre enfant plus résistant aux arachides, mais il ne s'agit pas d'un remède contre l'allergie. Il est important que votre enfant continue à prendre quotidiennement PALFORZIA® afin de maintenir la valeur seuil augmentée.

L'allergie à l'arachide et votre enfant

Guide destiné aux parents et aux personnes en charge

PALFORZIA_Caregiver Guide_CH_V1.0

Prise de PALFORZIA®


Comment et quand mon enfant doit-il prendre PALFORZIA®?

- Votre enfant doit prendre PALFORZIA® tous les jours, et ce toujours à peu près à la même heure. De préférence lors du dîner.
- Il ne doit pas avaler la gélule ni inhaler la poudre. Le contenu des gélules et des sachets doit être mélangé à des aliments qui ne sont ni trop chauds ni trop liquides.
- Utilisez une petite quantité d'un aliment que votre enfant apprécie et qu'il peut facilement manger en quelques cuillerées. Les yaourts, les compotes de pommes ou les puddings sont, par exemple, particulièrement adaptés.
- Vous ne devez pas mélanger le médicament avec du lait, des soupes ou des smoothies.
- Votre enfant doit continuer à éviter de consommer des arachides ou des aliments qui en contiennent.
- Il doit toujours avoir un stylo d'adrénaline sur lui.
- Veillez à ce que votre enfant reste calme et ne fasse pas de sport juste avant et dans les 2 à 3 heures suivant la prise de PALFORZIA®.
- Veillez également à ce que votre enfant ne prenne pas de bain chaud ou de douche chaude juste avant et dans les 2 à 3 heures suivant la prise de PALFORZIA®.
- Il doit attendre au moins 2 heures après avoir pris PALFORZIA® avant d'aller se coucher.

Pour rappel: Votre enfant ne doit pas avaler les gélules. Il faut ouvrir les gélules, verser leur contenu sur les aliments et bien mélanger.

Les trois phases du traitement

Si le médecin a décidé que votre enfant peut commencer le traitement par PALFORZIA®, il instaurera la première des trois phases de dosage, cela afin qu'il ou elle puisse augmenter progressivement la quantité du médicament que votre enfant prend. Lors de la 1ère phase, la phase initiale à doses croissantes, votre enfant reçoit PALFORZIA® sous forme de gélules. Lors de la 2ème phase, la phase d'augmentation de la dose, PALFORZIA® est administré sous forme de gélules jusqu'au dernier palier où la dose se présente sous forme de sachet. Lors de la 3ème phase, le traitement d'entretien, votre enfant reçoit PALFORZIA® en sachets. Dans toutes les phases, le contenu des gélules ou des sachets de PALFORZIA® doit être mélangé à des aliments pour que votre enfant puisse l'avalier.



Phase 1 – phase initiale à doses croissantes (deux jours)

Lorsque votre enfant commence son traitement par PALFORZIA®, vous devez l'emmener chez le médecin deux jours de suite.

Jour 1 – durée totale approximative de la visite au cabinet médical: 4 à 5 heures

- Si votre enfant se sent suffisamment bien pour commencer le traitement, il reçoit une dose de PALFORZIA® **toutes les 30 minutes**, jusqu'à ce qu'il ait pris **cinq doses**, au sein du cabinet médical et sous surveillance médicale.
- Au début, les doses sont administrées en petites quantités de 0,5 mg, puis augmentent progressivement pour arriver à 6 mg. Une fois que votre enfant a pris toutes les doses, le médecin l'examine pour voir s'il se sent bien.
- Si des symptômes graves nécessitant une intervention médicale apparaissent durant cette phase (notamment en cas d'administration d'adrénaline), le traitement par PALFORZIA® sera interrompu.
- Une fois que votre enfant a pris la cinquième dose, vous devez rester avec lui au cabinet pendant au moins 1 heure afin que le médecin puisse s'assurer que votre enfant va bien.
- Si votre enfant tolère la quatrième dose, mais pas la cinquième, il peut poursuivre le traitement, mais il doit revenir au cabinet avant de commencer la phase 2 du traitement (augmentation de la dose).

Jour 2 – durée totale approximative de la visite au cabinet médical: 2 heures

- Si votre enfant a toléré les doses au jour 1, vous revenez au cabinet au jour 2.
- Les médecins et le personnel soignant effectuent quelques examens de santé et demandent comment votre enfant s'est senti à la maison après son passage au cabinet. S'il se sent bien et si les examens ont permis d'obtenir de bons résultats,

le médecin donne une dose de 3 mg de PALFORZIA® à votre enfant et observe comment il se sent.

- Si votre enfant tolère cette dose, vous recevez un stock de doses de 3 mg de PALFORZIA® à emporter chez vous. Cela suffit pour deux semaines.
- Au cours des deux semaines suivantes, votre enfant doit prendre PALFORZIA® à la maison, et ce une fois par jour au cours du repas.

Si votre enfant prend PALFORZIA® à la maison, vous devez impérativement respecter les consignes de la page 22. Si votre enfant ne se sent pas bien ou présente une réaction allergique à un moment donné, il doit impérativement vous le dire. Vous devez alors utiliser le stylo d'adrénaline et, éventuellement, appeler les urgences. En cas de doutes, parlez-en à votre médecin.

Pour rappel:

-  **Ne donnez pas la dose de PALFORZIA® à votre enfant les jours où vous allez chez le médecin pour recevoir une nouvelle dose.**
-  **Votre enfant doit continuer à prendre PALFORZIA® tous les jours pour que le médicament puisse agir correctement.**
-  **De plus, votre enfant doit toujours rester très prudent et ne doit pas consommer d'arachides ni d'aliments qui en contiennent.**
-  **Il doit toujours avoir un stylo d'adrénaline sur lui.**


Phase 2 – phase d’augmentation de la dose (au moins 22 semaines)

- Au bout de deux semaines, vous devez retourner chez le médecin avec votre enfant pour qu’il ou elle voie si votre enfant est prêt à recevoir une nouvelle dose, légèrement plus élevée, de PALFORZIA®.
- **Votre enfant ne doit pas prendre sa dose de PALFORZIA® à domicile les jours où il se rend chez le médecin.**
- Si le traitement de votre enfant se passe bien, le médecin lui donne une nouvelle dose plus puissante et le garde en observation pendant au moins 1 heure ou jusqu’à ce qu’il ou elle considère qu’il peut rentrer à la maison avec vous.
- Chez vous, votre enfant doit prendre PALFORZIA® tous les jours et à peu près au même moment, de préférence le soir. Au bout de deux semaines, il retourne chez le médecin et si tout va bien, il reçoit une nouvelle dose un peu plus puissante.
- Cette prise quotidienne à domicile se déroule sur au moins 22 semaines au cours desquelles votre enfant se rend chez le médecin toutes les deux semaines. Durant cette période, la dose de PALFORZIA® est augmentée en 11 paliers, de 3 mg à 300 mg par jour.
- Si votre enfant a omis une dose, a été malade, a eu des effets secondaires ou des réactions allergiques ou s’il va traverser une période particulièrement stressante (p. ex. examens), le médecin peut décider de maintenir la dose ou de la réduire, puis de voir comment votre enfant se sent au bout de deux semaines. Son organisme peut ainsi mieux s’adapter à la dose. Le médecin vous expliquera cela, le cas échéant.
- Le médecin veillera à ce que votre enfant reçoive la bonne dose de PALFORZIA®, qu’il prendra chaque jour à domicile jusqu’à la prochaine consultation médicale.



Phase 3 – traitement d’entretien

- Si votre enfant peut prendre en toute sécurité la dose d’entretien quotidienne de 300 mg, cela signifie qu’il a atteint la phase 3.
- **Comme jusqu’à présent, votre enfant ne doit pas prendre sa dose de PALFORZIA® habituelle à domicile le jour où il se rend chez le médecin.**
- Vous et votre enfant recevez une boîte contenant des sachets de 300 mg de PALFORZIA® pour un mois, à emporter. Vous trouverez à la page suivante des instructions sur la manière de mélanger PALFORZIA® aux aliments.
- Pendant la phase d’entretien, le médecin de votre enfant déterminera la fréquence des rendez-vous de contrôle.
- Surveillez votre enfant pendant environ 2 heures après la prise de la dose pour voir si des symptômes de réaction allergique apparaissent.



Pour rappel:



Votre enfant doit continuer à prendre PALFORZIA® tous les jours pour que le médicament puisse agir correctement.



De plus, votre enfant doit toujours rester très prudent et ne doit pas consommer d'arachides ni d'aliments qui en contiennent.



Votre enfant doit toujours avoir un stylo d'adrénaline sur lui.

Mélanger PALFORZIA® aux aliments

- PALFORZIA® se présente sous forme de gélules ou de sachets – en gélules de 1 à 100 mg jusqu'au palier 10 (240 mg) et en sachets à partir du palier 11 (300 mg). Toutes les gélules et tous les sachets contiennent du PALFORZIA® sous forme de poudre, que vous ou votre enfant mélangez dans une petite quantité de nourriture.
- Veillez à ne pas mélanger PALFORZIA® dans une trop grande portion afin que votre enfant puisse manger toute la dose sans problème en seulement quelques cuillerées. De plus, les aliments ne doivent pas être chauffés.
- Pendant la phase 2 (augmentation de la dose), la boîte de PALFORZIA® qui est remise à votre enfant est divisée en doses quotidiennes, qui peuvent être constituées d'une ou de plusieurs gélules individuelles. Pendant la phase 3 (traitement d'entretien), la boîte de PALFORZIA® qui est remise à votre enfant est divisée en doses quotidiennes, constituées de sachets individuels de 300 mg.



- Videz tout le contenu de la/des gélule(s) ou du sachet dans un bol avec une petite quantité d'un aliment mou, pas trop chaud ni trop liquide (un yaourt, une compote de pommes ou un pudding conviennent bien).
- Si vous utilisez une ou plusieurs gélules, ouvrez-les au-dessus du récipient contenant la nourriture et versez la poudre dessus. Si vous utilisez un sachet, tenez-le au-dessus de la nourriture, découpez le haut du sachet avec des ciseaux et videz son contenu sur la nourriture.



- Mélangez la poudre aux aliments jusqu'à ce qu'elle soit complètement mélangée et qu'il n'y ait pas de grumeaux.



- Veillez à ce que votre enfant mange toute la portion dans laquelle vous avez mélangé la dose de PALFORZIA®.



- Jetez le sachet ou les gélules vides à la poubelle.



- Lavez-vous immédiatement les mains après avoir manipulé les gélules ou sachets de PALFORZIA®.



- Si, pour une raison quelconque, le mélange de PALFORZIA® et d'aliments ne peut pas être pris, vous pouvez conserver le mélange préparé jusqu'à huit heures au réfrigérateur.
- Si votre enfant ne mange pas la dose dans les huit heures suivant sa préparation, jetez-la et préparez un nouveau mélange.

? Que faire si mon enfant a omis une dose de PALFORZIA®?

Ne pas prendre de dose double si la dose précédente a été omise!

Si votre enfant oublie de prendre PALFORZIA® pendant un jour ou deux, veillez à ce qu'il prenne la dose suivante le jour suivant à l'heure habituelle.

S'il oublie de prendre son traitement PALFORZIA® **pendant trois jours ou plus**, vous devez contacter le médecin avant que votre enfant prenne la dose suivante.

Votre enfant devra probablement retourner chez le médecin et prendre son traitement PALFORZIA® en sa présence s'il a oublié de prendre ses doses pendant quelques jours. Le médecin vérifiera alors que votre enfant est en bonne santé et que tout va bien.

Comprendre les doses de PALFORZIA®

La phase d'augmentation de la dose de PALFORZIA® est divisée en 11 paliers.

La dose quotidienne de PALFORZIA® est légèrement augmentée à chaque palier.

Pour les 10 premiers paliers, les doses se présentent sous forme de gélules de formes, tailles et couleurs différentes, conditionnées dans des blisters séparés. Au 11ème palier et pendant le traitement d'entretien, la dose quotidienne se présente sous forme de sachet.

Les illustrations montrent les gélules et le sachet de chaque palier de la phase d'augmentation de la dose.

Il est important de noter le numéro de lot de PALFORZIA®. Donc, chaque fois que vous recevez une nouvelle boîte de PALFORZIA®, notez la date et le numéro de lot (qui se trouve sur la boîte après «LOT») et conservez ces informations en lieu sûr.

Palier 1

(Dose quotidienne 3 mg)



Palier 2

(Dose quotidienne 6 mg)



Palier 3

(Dose quotidienne 12 mg)



Palier 4

(Dose quotidienne 20 mg)



Palier 5

(Dose quotidienne 40 mg)



Palier 6

(Dose quotidienne 80 mg)



Palier 7

(Dose quotidienne 120 mg)



Palier 8

(Dose quotidienne 160 mg)



Palier 9

(Dose quotidienne 200 mg)



Palier 10

(Dose quotidienne 240 mg)



Palier 11

(Dose quotidienne 300 mg)



4

Autres consignes pratiques

Autres consignes pratiques

? Où doit être conservé PALFORZIA®?

Conservez PALFORZIA® hors de portée des enfants, dans un endroit chez vous où la température ambiante ne dépasse pas 25 °C. Conservez donc le médicament dans un endroit à température ambiante modérée, où il ne sera pas non plus exposé directement aux rayons du soleil. Une armoire dans un endroit frais et sombre pourrait être la plus appropriée.

Si le médecin vous a dit que votre enfant a terminé un palier d'augmentation de la dose, vous devez jeter toutes les doses restantes (gélules ou sachets) de cette boîte avant que votre enfant ne commence un nouveau palier. Cela s'applique également à toutes les doses supplémentaires contenues dans chaque boîte et que votre enfant n'a pas consommées.

? Que doit faire mon enfant avec sa carte de patient?



Votre enfant reçoit une carte de patient sur laquelle est indiqué qu'il prend PALFORZIA®. Vous ou votre enfant devez écrire sur cette carte des informations sur votre enfant et veiller à ce qu'il la montre à un médecin, un infirmier ou un aide-soignant lorsqu'il doit se rendre chez le médecin ou à l'hôpital.

? Grossesse et PALFORZIA®?

Les jeunes filles ou les femmes ne doivent pas commencer à prendre PALFORZIA® si elles sont enceintes ou prévoient de l'être. Si une jeune fille ou une femme est enceinte, allaite, pense qu'elle pourrait être enceinte ou souhaite avoir un enfant, elle doit demander conseil à son médecin avant de prendre ce médicament.

? Règles et PALFORZIA®?

La réaction de l'organisme à PALFORZIA® peut changer en raison des règles, et les symptômes allergiques peuvent être plus probables.

? Alcool et PALFORZIA®?

La consommation d'alcool peut augmenter la probabilité d'une réaction allergique après la prise de PALFORZIA®.

L'allergie à l'arachide et votre enfant

Guide destiné aux parents et aux personnes en charge

PALFORZIA_Caregiver Guide_CH_V1.0



Déclaration des effets secondaires

Si vous constatez des effets secondaires, adressez-vous à votre médecin ou pharmacien. Cela vaut en particulier pour les effets secondaires qui ne sont pas indiqués dans cette notice.



PALF-NP-CH-0042_05/2022